



¡PIENSA EN AMILOIDE!

Amiloidosis cardiaca por transtirretina (ATTR-CA)


Altamente prevalente y subdiagnosticada como causa de falla cardiaca (FC)

BANDERAS ROJAS CLINICAS




Demográficos

- Edad > 60 años
- Africo-americano
- Edad avanzada con falla cardiaca



Hipotensión ortostática o Polineuropatía

- Mareos o síncope



Estenosis lumbar

- Dolor lumbar crónico



Falla Cardiaca

- HFpEF or HFrEF
- Múltiples ingresos por FC descompensada
- Mala tolerancia a tratamiento estándar
- Elevación crónica leve de troponinas



Tunel del carpo bilateral


- Dolor y entumecimiento en los dedos



Arritmias y bloqueos cardíacos

- Fibrilación auricular
- Marcapasos
- Síndrome de taqui/bradicardia
- Baja tolerancia a los betabloqueadores

Banderas rojas en imagen cardiovascular




Grosor del VI aumentado de moderado a severo




Aumento del grosor de la pared del ventrículo derecho




Engrosamiento del tabique interauricular y valvular



Strain longitudinal global alterado con preservación apical




RM con reforzamiento subendocárdico difuso



Bajo voltaje en el ECG

Estudio confirmatorio

1. Gammagrafía con Tc-99m fosfatos (PYP, HMDP, DPD)
2. Descartar amiloidosis de cadenas ligeras:
 - a. Cuantificación de cadenas ligeras kappa/lambda en suero y orina
 - b. Electroforesis de proteínas en suero y orina con inmunofijación
3. Test genético



Gammagrama con PYP positivo (altamente específico para ATTR-CA)



Obten más recursos de ATTR-CA

Escanea con tu cámara