




¡PIENSA EN AMILOIDE!

Amiloidosis cardiaca por transtirretina (ATTR-CA)

Una forma frecuente, pero poco reconocida, de miocardiopatía infiltrativa progresiva y potencialmente mortal.


- En población afroamericana (mutación V142I) prevalencia del 4% de ATTR-CA hereditaria
- Más del 15% de prevalencia en adultos mayores de ATTR-CA de tipo salvaje.
- La infiltración miocárdica en la amiloidosis es sugerida por varias características ecocardiográficas



Aumento moderado a severo del grosor de la pared del ventrículo izquierdo (>12mm)




Aumento del grosor de la pared del ventrículo derecho



Aumento del grosor del tabique interauricular, engrosamiento valvular y dilatación biauricular



Características del llenado ventricular izquierdo de tipo restrictivo



Strain longitudinal global alterado con preservación apical

Ante hallazgos, el informe del ecocardiograma debe recomendar:

1. Gammagrafía con Tc-99m fosfatos (PYP, HMDP, DPD)
2. Descartar amiloidosis de cadenas ligeras:
 - a. Cuantificación kappa/lambda en suero y orina
 - b. Electroforesis de proteínas en suero y orina con inmunofijación

Get More ATTR-CA Resources



Hover over image with your camera